

ວິທີການ ໃນການຮັບຢາວັກຊີນ COVID-19 (라오스어)

<ໜຶ່ງ ມື້ກ່ອນໄປສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ>

01. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19

- ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ສໍາລັບຂໍ້ມູນການ ຈອງຄົວເພື່ອສັກຢາປ້ອງກັນ ພະຍາດ COVID-19 ແລະໃຫ້ກວດເບິ່ງ ສະຖານທີ່ສັກຢາ ແລະວັນເວລາອີກ ຄັ້ງໜຶ່ງ.
- ຍ້ອນວ່າອາດມີການຕິດຂັດດ້ານຈາລະຈອນ, ຄວນທີ່ຈະກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງ ການເດີນທາງ ແລະເດີນທາງ ໄປສະຖານທີ່ສັກຢາໂດຍຜ່ານວິດສາ ທາລະນະ.
- ສໍາລັບການສັກຢາປ້ອງກັນໃນມື້ຕໍ່ມາ, ໃຫ້ກຽມເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສາມາດເຫັນສ່ວນເທິງຂອງແຂນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາ.

<ໃນມື້ສັກຢາກັນພະຍາດ>

02. ກ່ອນອອກເດີນທາງຈາກເຮືອນ.

- ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງມື້ນີ້. ຖ້າທ່ານມີອາການເປັນໄຂ້, ອາດຈະໄດ້ໃຈໃນການສັກຢາ.
- ໃສ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ໜ້າກາກທີ່ກຽມພ້ອມ ແລ້ວເດີນທາງໄປສັກຢາກັນພະຍາດ.
- ຄວນຮອດກ່ອນເວລາທີ່ນັດໝາຍໄວ້ 30 ນາທີ.

03. ເມື່ອຮອດສະຖານທີ່ສັກຢາກັນພະຍາດ

- ເມື່ອທ່ານມາຮອດສະຖານທີ່ສັກຢາກັນພະຍາດແລ້ວ, ໃຫ້ສະແດງບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານຫຼື ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການ ຈອງຄົວສໍາລັບການສັກຢາ ຂອງທ່ານ.
- ຫຼັງຈາກກວດອ່ານຫຼັກຖານຂອງທ່ານແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ຫ້ອງວ່າຖ້າການສັກຢາ.

04. ການກະກຽມຕາຕະລາງເບື້ອງຕົ້ນ

- ປະກອບແບບຟອມເບື້ອງຕົ້ນ.

05. ການປຶກສາຂັ້ນຕົ້ນ (ການປຶກສາກັບທ່ານເໝາະ)

- ປຶກສາກັບທ່ານ ເໝາະ.
- ສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັກຢາ COVID-19.

06. ການສັກຢາປ້ອງກັນ

- ໄປທີ່ຫ້ອງສັກຢາ ແລະ ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ COVID-19.

07. ວ່າຖ້າຢູ່ຫ້ອງສັງເກດການ

- ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນ, ວ່າຖ້າຢູ່ໃນຫ້ອງສັງເກດການປະມານ 15 - 30 ນາທີ ເພື່ອກະກຽມ ສັງເກດເບິ່ງສິ່ງ ຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

08. ກັບເຮືອນ

- ຫຼັງຈາກວ່າຖ້າຢູ່ໃນຫ້ອງສັງເກດການ ສໍາເລັດແລ້ວ, ຄວນກັບບ້ານໄວ້ທີ່ຈະໄວ້ໄດ້ ແລະບໍ່ຄວນຢູ່ເກີນເວລາ.
- ໝາຍວັນທີ ທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນຄັ້ງທີສອງ ໃສ່ໃນປະຕິທິນຂອງທ່ານໄວ້.

09. ເວລາຢູ່ເຮືອນ

- ຫຼັງຈາກການສັກຢາບ້ອງກັນແລ້ວ, ອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິ, ີ ແລະນີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ ຮ່າງກາຍກຳລັງສ້າງຜູ້ມາດຕະຖານ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫາຍໄປພາຍໃນ 2-3 ວັນ

	ພະແນກ	ສະຖານທີ່ສັກຢາບ້ອງກັນ	ຮ່າງກາຍທັງໝົດ
ອາການທົ່ວໄປແລະກາຍ ນຳສັກຢາ ການສັກຢາ	ອາການ	ປັດ ໃຈບ່ອນ	ໄຂ້ ໄມ້ອຍລົງ ໜາວສັນ ໄຈັບຫົວ
	ການຮັກສາ	ໃຊ້ຜ້າທີ່ສະອາດ ຈຸມນໍ້າເຢັນແລ້ວເອົາມາ ປົກໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເຈັບນັ້ນ. ອອກກຳລັງກາຍແຂນ ຫລື ພະຍາຍາມເຄື່ອນໄຫວແຂນ	ສາມາດຢູ່ບ່ອນຊຸ່ມຊື່ນແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ - ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ເບົາບາງ
		ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບການກິນຢາແກ້ໄຂ້ ແລະຢາເຕັກບອດ, ແຕ່ແນະນຳ ໃຫ້ກິນຢາ ທີ່ບັນຈຸສານອາເຊຕາມິນໃນເຊິ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບໃນການກຳຈັດ ການອັກເສບ ໃຫ້ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.	ກະກຽມຢາແກ້ໄຂ້ ແລະຢາເຕັກບອດກ່ອນການສັກຢາ .

- ອາການສ່ວນໃຫຍ່ຈະດຶງດູດໂດຍການກິນຢາແກ້ໄຂ້ຫລືຢາເຕັກບອດ, ແຕ່ຖ້າມີອາການໃຈບ່ອນ, ເຈັບ, ອອກຜິນແດງ ຢູ່ບໍລິເວນສັກຢາເປັນ ເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ວັນ, ໃຫ້ປຶກສາທ່ານໝ.
- ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ທີ່ຮຸນແຮງ (ອາການຜູ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອື່ນໆ) ພ້ອມດ້ວຍການຫາຍໃຈຜິດ, ເສຍສະຕາ, ຫຼືມີອາການໄຄ່ບວມຕາມໃບຫນ້າ, ກະລຸນາໂທ 911 ໂດຍດ່ວນ ຫຼື ໄປທີ່ຫ້ອງສຸກເສີນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

<ການແປພາສານີ້ໄດ້ເຮັດຢູ່ທີ່ສູນກາງໂທລະສັບ ດາລູຣີ 1577-1366>